

## MUCOSA COMPOSITUM® AD US. VET

Protector de mucosas

Solución inyectable

Elaborado por Biologushe Heilmittel Heel GmbH

### Presentación:

5 ampollas de 5 mL

### Composición:

Cada 5 mL contiene:

Mucosa nasalis suis D8	0.05 mL
Mucosa oris suis D8	0.05 mL
Mucosa pulmonis suis D8	0.05 mL
Mucosa oculi suis D8	0.05 mL
Mucosa vesicae felleae suis D8	0.05 mL
Mucosa pilori suis D8	0.05 mL
Mucosa duodeni suis D8	0.05 mL
Mucosa oesophagi suis D8	0.05 mL
Mucosa jejuni suis D8	0.05 mL
Mucosa ilei suis D8	0.05 mL
Mucosa coli suis D8	0.05 mL
Mucosa recti suis D8	0.05 mL
Mucosa ductus choledochi suis D8	0.05 mL
Mucosa vesicae urinariae suis D8	0.05 mL
Ventriculus suis D8	0.05 mL
Pankreas suis D10	0.05 mL
Argentum nitricum D6	0.05 mL
Atropa belladonna D10	0.05 mL
Oxalis acetosella D6	0.05 mL
Semecarpus anacardium D6	0.05 mL
Phosphorus D8	0.05 mL
Lachesis mutus D10	0.05 mL
Ipecacuanha D8	0.05 mL
Nux vomica D13	0.05 mL
Veratrum album D4	0.05 mL
Pulsatilla pratensis D6	0.05 mL
Kreosotum D10	0.05 mL
Sulfur D8	0.05 mL
Bacterium coli-Nosode D28	0.05 mL
Marsdenia cundurando D6	0.05 mL
Kalium bichromicum D8	0.05 mL



Hydrastis canadensis D4	0.05 mL
Mandragora e radice siccato D10	0.05 mL
Momordica balsamina D6	0.05 mL
Ceanothus americanus D4	0.05 mL
Natrium diethylalaceticum D8	0.05 mL
Excipientes c.s.p	5,0 mL

### Descripción:

Mucosa compositum® es una terapia multicompuesto con acción protectora de mucosas. Favorece la recuperación de los daños en las mucosas debido a procesos inflamatorios, alérgicos, infecciosos o degenerativos (ulceraciones). Para usarse en patologías que afectan a las mucosas del tracto digestivo, del sistema respiratorio alto y bajo, del tracto urogenital, conjuntiva del ojo, también en panleucopenia, infección por Herpes y rinovirus, parvovirus, enteritis crónica, otitis, conjuntivitis y endometritis.

**Especie de destino:** Perros, Gatos, Caballos, Vacas, Cerdos y Ovejas

### Dosis y Administración

Caballo, vaca, cerdo:	5ml
Cerdito:	2-3ml
Oveja, cabra:	2ml
Perro grande:	3-4ml
Perro mediano:	2ml
Perro pequeño:	1-2ml
Cachorro:	0.5-1ml
Gato:	1-2ml

En casos con síntomas agudos, la dosis indicada puede repetirse después de un período de 24 horas. Para tratamientos de patologías que tienden a repetirse, afecciones crónicas o tratamientos a largo plazo, la dosis individual puede ser administrada en intervalos de 4 días.

### Vía de Administración

Oral, Subcutánea, Intramuscular, Endovenosa, Intraarticular

### Modo de empleo

### Condiciones de almacenamiento

Almacenar a no más de 25°C. Proteger del calor y la luz solar directa.

### REG SAG: