

TRAUMEEL® AD US. VET

Modulador de la inflamación y el dolor

Tabletas

Elaborado por Biologushe Heilmittel Heel GmbH

Presentación:

Envase con 100 tabletas



Composición:

Cada tableta contiene:

Calendula officinalis D3	15 mg
Hamamelis virginiana D3	15 mg
Achillea millefolium D3	15 mg
Atropa belladonna D4	75 mg
Aconitum napellus D3	30 mg
Mercurius Solubilis Hahnemani D8	30 mg
Hepar sulfuris D8	30 mg
Chamomilla recutita D3	24 mg
Symphytum officinale D8	24 mg
Bellis perennis D3	6 mg
Echinacea D3	6 mg
Echinacea purpurea D3	6 mg
Arnica montana D3	15 mg
Hypericum perforatum D2	3 mg

Descripción:

Traumeel® es una terapia multicomponente con efecto inhibidor de las citoquinas proinflamatorias y estimulador de citoquinas antiinflamatorias. Además, estimula la fagocitosis y la actividad de los granulocitos. Por otro lado, ha demostrado una actividad inmunomoduladora con activación de los linfocitos Th3 y una inhibición de las enzimas proinflamatorias COX 1 y COX 2.

Traumeel® es una terapia coadyuvante en el tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada, asociada a traumatismo y otros procesos inflamatorios y degenerativos como las lesiones y sus resultados, ej.: contusión cerebral, fracturas, luxaciones, contusiones, quemaduras, inflamación post operatoria o post traumática, edemas, hematomas.

Procesos inflamatorios de diferentes tipos y localizaciones. Ej.: Flegmones, abscesos, inflamación de los sacos anales, otitis, descarga vaginal inflamatoria, dermatitis, conjuntivitis, mastitis.

Procesos inflamatorios y degenerativos que se acompañan de inflamación, especialmente las del sistema conectivo y locomotor, ej.: Artritis, tendovaginitis, bursitis, agallas del corvejón.

Especie de destino: Perros, Gatos, Caballos, Vacas, Cerdos y Ovejas

Dosis y Administración

Caballo, Vaca:	6-10 tabletas, dos a tres veces al día
Cerdos:	3 tabletas, dos a tres veces al día
Oveja, cabra:	2 tabletas, dos a tres veces al día
Perro grande:	3 tabletas, dos a tres veces al día
Perro mediano:	2 tabletas, dos a tres veces al día
Perro pequeño:	1 tableta, dos a tres veces al día
Gato:	1 tableta, dos a tres veces al día

En caso de síntomas muy agudos, la dosis indicada puede repetirse de media hora a una hora durante un periodo de 4 horas

Vía de Administración

Oral

Modo de empleo

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a no más de 25°C.

REG SAG: