

Vacuna Sub unitaria contra Circovirus Porcino Tipo 2

Elaborado por Komipharm Internacional Co., Ltda.

Presentación:

Suspensión inyectable frasco Multidosis 50 ml.

Composición:

Cada 1 ml de vacuna contiene:

Glicoproteína ORF2 de Circovirus Porcino Tipo 2	200 ug
Exipientes c.s.p.	1 ml



Modo de Acción:

Vacuna que estimula la inmunidad activa de los lechones y chanchillas contra Circovirus Porcino Tipo 2; en reproductoras para estimular la inmunidad pasiva a la camada contra Circovirus Porcino Tipo 2.

Indicaciones

Actúa en la prevención de la viremia y excreción del Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2), por lo que ayuda a reducir la mortalidad y a aumentar la ganancia de peso de los cerdos si son afectados por PCV2 durante el período de engorda.

Especie destino

Cerdos: lechones, chanchillas y reproductoras.

Posología

Lechones: aplicar 1 dosis de 1 ml, entre las 3 y 4 semanas de edad (lechones de madres no vacunadas).

Chanchillas: aplicar dosis de 2ml, entre los 180 – 210 días de edad.

Reproductoras: aplicar dosis de 2ml, 4 a 5 semanas antes del parto. Revacunar en cada gestación.

Vía de administración

Intra Muscular.

Modo de empleo

Antes de utilizar la vacuna, dejar que alcance la temperatura ambiente (15 – 25°C) y agitar bien antes de usar.

Mantener el producto refrigerado entre 2 y 8 °C.

Contraindicaciones y Advertencias

No vacunar lechones menores de 3 semanas de edad, ni lechones provenientes de madres vacunadas.

No utilizar en animales enfermos o inmunodeprimidos.

Período de resguardo

0 días.

REG SAG: 2335-B