

PANVEX

Oxitetraciclina y Flunixin Meglumina Solución inyectable

Composición:

Cada ml contiene

Oxitetraciclina Dihidrato300mg

Flunixin Meglumina20mg

Excipientes c.s.p 1ml

Especies: Bovinos

Indicaciones:

Indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias en bovinos asociadas a *Pausterella Haemolytica* y en aquellas otras condiciones donde requiera además un efecto antiinflamatorio y antipirético. Tratamiento de un amplio rango de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina, como *staphylococcus aureus*, *escherichia coli*, *streptococcus aureus*, *pasteurella spp*, *arcanobacterium pyogenes* y ciertos mycoplasmas asociados a enfermedades respiratorias y/o neumonía.

Dosis:

1 ml/10 kg de peso vivo, dosis única

Vía de Administración:

Administración por inyección intramuscular

Contraindicaciones

No administrar en animales que tienen enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.

No administrar en animales donde hay una posibilidad de ulceración gastrointestinal o sangrado.

No administrar en animales con hipersensibilidad a la oxitetraciclina o Flunixin.

No usar en animales deshidratados, hipovolémicos, hipotensivos.

No administrar a animales preñados o en lactancia

Efectos no deseados

Los informes de reacciones adversas asociadas con la administración vía intramuscular de oxitetraciclina y flunixin incluyen la inflamación de la zona de inyección, agitación, sudoración y/o ataxia. En pequeños animales, las tetraciclinas pueden causar náuseas, vómitos anorexia y diarrea.

El tratamiento prolongado con tetraciclinas puede producir un sobrecrecimiento (superinfección) de bacterias y hongos no susceptibles.

Después de administración de flunixin en el ganado bovino, reacciones anafilácticas se han reportado, algunos de los cuales han sido mortales, después de uso intravenoso.





Advertencias:

No administrar en animales preñados o en lactancia

No usar por vía endovenosa

Periodo de resguardo:

Carne: 35 días

Leche: no usar en vacas cuya leche este destinada al consumo humano

Precauciones especiales de conservación:

Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C, protegido de la luz.

Una vez abierto el envase, utilizar su contenido dentro de 28 días

Presentación

Estuche con frascos multidosis de 100 ml

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Resolución SAG:

N° 1406-B