

REHSAL-VET

sales rehidratantes

Composición:

Cada sachet contiene:
Cloruro de Sodio 3,50 g;
Cloruro de Potasio 1,50 g;
Citrato de sodio 2,94;
Glucosa 20,0 g.



Especies: Equinos y Rumiantes

Indicaciones:

Equinos

Patologías: Diarreas infecciosas, "X", neumonías cursando con anorexia y adipsia, septicemias, fiebre alta, y toda condición que evoluciona hacia la subdeshidratación o deshidratación vera. Restitución fisiológica: esfuerzos de gran fatiga muscular: rodeo, deportes ecuestres, FS de carreras, con fines de recuperación de la dinámica. Ayuno pre y postoperatorio.

Rumiantes

Primera elección en diarreas infecciosas neonatales de terneros, cabritos y corderos. Excelente respuesta en infecciones virales o bacterianas agudas que cursan con anorexia y adipsia, especialmente neumonías. El recurso más eficaz para restaurar el equilibrio hidrosalino y reponer la biodisponibilidad de fármacos de administración necesaria para los cuadros citados.

Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:

Solo vía oral mediante recipientes o botellas plásticas de gaseosas. Disolver 1 – 2 sobres en 1 litro de agua y administrar 1 litro por 20 kilos en estados de deshidratación aguda en terneros, potrillos, corderos y cabritos. En estados de recuperación disminuir los volúmenes de administración. En casos de fatiga muscular por ejercicio, sudoración excesiva, de animales de competencia: 1 sobre por litro y 1 litro por 100 kilos de peso mediante sonda nasogástrica en equinos adultos.

Reacciones Adversas:

Amplio margen de seguridad. La capacidad de saturación de absorción es muy superior a las dosis sugeridas.

Período de Resguardo:

No tiene

Presentación: envase de 25 sachets de 27,94 g de polvo en aluminio hidropotejado