VADEMECUM 2023

EQUINOS

AGROVET
Salud Animal



MT.X Plus

SECUESTRANTE DE MICOTOXINAS DE AMPLIOESPECTRO

Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro. Atrapa desde moléculas muy pequeñas como las aflatoxinas a moléculas grandes como Fumonisinas, con propiedades inmunoestimulantes.

Indicado para combatir problemas reproductivos y productivos producidos por la presencia de micotoxinas en en alimento.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

1g por Kg de materia seca (Dosis práctica = 10g en pre parto y 20g en post parto).

PRESENTACIÓN:

Saco de 25kg

COMPOSICIÓN:

Se compone de una nueva molécula híbrida y estable llamada AMADEITA®. Consiste en arcilla cuyas láminas son intercaladas con pilares de polisacáridos de algas.

El excipiente utilizado por MT.X PLUS consiste en varios secuestrantes existentes en el mercado: Montmorillonita, MOS, Tierra de diatomea (secuestra metales pesados y endotoxinas). También posee extractos de algas que estimulan el sistema inmune.

PARA USO EN:

Rehsal VET

REHIDRATANTE Y ENERGIZANTE

Equinos: Patologías, diarreas infecciosas, neumonías cursando con anorexia y adipsia, septicemias, fiebre alta, y toda condición de subdeshidratación o deshidratación, restitución fisiológica: esfuerzos de gran fatiga muscular: con fines de recuperación de la dinámica.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Solo vía oral mediante recipientes o botellas plásticas de bebidas.

Disolver 1 - 2 sobres en 1 litro de agua y administrar 1 litro por 20 kg (de peso vivo) en estados de deshidratación aguda en terneros, potrillos, corderos y cabritos.

En estados de recuperación disminuir los volúmenes de administración.

En casos de fatiga muscular por ejercicio, sudoración excesiva de animales de competencia: 1 sobre por litro y 1 litro por 100kg de peso (de peso vivo) mediante sonda nasogástrica en equinos adultos.

COMPOSICIÓN:

Cada sachet contiene; Cloruro de sodio 3.50 gr, cloruro de potasio 1,50 gr, citrato de sodio 2.94g, glucosa 20.00g.

PRESENTACIÓN:

Estuche de 25 sachet de aluminio.

PARA USO EN:



Searup

REFUERZA LAS DEFENSAS NATURALES Y CORRIGE LOS DESEQUILIBRIOS OCASIONALES

Searup está recomendado durante los periodos de estrés y como refuerzo de los programas de vacunación.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

0,5 a 1 ml/litro de agua/día en función del estado fisiológico o por (cada) 10 kg de peso vivo día por 3 a 5 días.

PRESENTACIÓN:

Searup Still Bidon de 1 litro.

COMPOSICIÓN:

Searup combina la acción de Polisacáridos Marinos Sulfatados (PMS) inmunomoduladores, vitaminas y aminoácidos. Los PMS inmunomoduladores contribuyen a mejorar la respuesta inmunitaria gracias a la activación de receptores específicos del sistema inmune innato.

PARA USO EN:

Indigest

RESTAURADOR GASTRO-ENTERO-HEPATO-PANCREATICO

Normalizador del funcionamiento gástrico, duodenal y biliar, indicado en aquellas situaciones en que se requiere una estimulación de las secreciones digestivas, tales como:

Caballos: Toxemias, anorexias, cólicos, insuficiencia hepática y pancreáticas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Actúa sobre las glándulas exocrinas de hígado, páncreas y estómago. Actúa como un Colerético y Colagogo.

Equinos: 20-30 ml. I/V lenta.

Contraindicaciones:

- No administrar a animales con alteraciones cardíacas, hipertermia, u obstrucción de vías biliares.
- No administrar este médicamente en el último tercio de gestación.

COMPOSICIÓN:

Membutona 10g

PERÍODO DE RESGUARDO:

2 días en carne y leche

PRESENTACIÓN:

Frasco 100 ml.

REGISTRO SAG:

N°696

PARA USO EN:

Frusemide

SOLUCIÓN INYECTABLE

Inhibe el transporte de sodio y agua en el asa ascendente de Henle, produciendo diuresis. También se indica para promover la diuresis en cuadros de insuficiencia/falla renal y para favorecer la eliminación de ciertas sustancias, incluyendo elevadas concentraciones de electrolitos, tales como Ca2+ y K+.

Caballos: se prescribe para el tratamiento de edemas y para prevenir la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Caballos: 5 – 10mL de Frusemide® (equivalente a 250 – 500mg totales de furosemida), cada 6 – 8 horas.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 50mL

COMPOSICIÓN:

Furosemida 50mg Excipientes c.s.p 1mL

PARA USO EN:

Gabbrostim®

REGULADOR DEL CICLO ESTRAL Y DESENCADENANTE DEL PARTO

En yeguas, estimulación del celo en yeguas con ciclo normal o en período post parto, yeguas en anestro. Y en conejas, sincronización del estro, o inducción del parto en conejas preñadas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

- Administrar por vía intramuscular a yeguas
- Dosis:
- Yeguas: 1,5ml de Gabbrostim® por animal.

No administrar en animales preñados, salvo en los casos indicados o cuando se desea producir un aborto terapéutico.

COMPOSICIÓN:

1 ml contiene: Alfaprostol 2 mg Excipientes c.s.p 1 ml.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 40mL

PARA USO EN:



Ketamidor®

KETAMINA CLORHIDRATO - SOLUCIÓN INYECTABLE

Anestésico disociativo que puede ser utilizado como agente anestésico para diagnóstico o procedimiento quirúrgico de corta duración.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Caballos:

Se requiere de premedicación con un sedante para un efecto anestésico suficiente

Con Detomidina:

Detomidina 20 µg/kg IV, después de 5 minutos Ketamina 2,2 mg/kg IV rápido (2,2 mL/100 kg)

Con Xilacina:

Xilacina 1,1 mg/kg IV, seguido de Ketamina 2,2 mg/kg IV (2,2 mL/100 kg)

PARA USO EN:

COMPOSICIÓN:

Ketamina Clorhidrato 115,33 mg (Equivalente a 100 mg de Ketamina base) Excipientes c.s.p 1mL

PERÍODO DE RESGUARDO:

2 días en carne y leche

PRESENTACIÓN:

Frasco 50 ml.

REGISTRO SAG:

N°2496

Trisoprim

ANTIBACTERIANO – ANTIBIÓTICO

Para el tratamiento sistémico e infecciones bacterianas causadas por microorganismos sensibles al trimetoprim y sulfadiazina en bovinos, equinos, ovinos y porcinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Aplicar 1.0 – 1.5 ml por cada 30 kilos de peso vivo por inyección IM.

PRESENTACIÓN:

Frasco ampolla de 100 y 250 ml.

Condición de venta:

Bajo receta Médico Veterinario

PARA USO EN:

COMPOSICIÓN:

Cada mL de solución contiene Sulfadiazina 400mg/ml y Trimetoprim 80mg/ml

PERÍODO DE RESGUARDO:

- Carne: 28 días
- Leche: 36 horas (una sola dosis)
- 72 horas (múltiples dosis).

REGISTRO SAG:

N° 773

Tildren 5 mg/ml

ANTIINFLAMATORIO - ESTEROIDAL

Pertenece a la familia de los bi-fostonatos, una clase de compuesto que tiene actividad en la reconstrucción del tejido óseo y cartílago, en patologías por diferentes etiopatologias.

Se recomienda el uso de este producto en equinos, para el tratamiento de cojeras asociadas con lesiones del cartílago y tejido óseo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Administración vía intravenosa lentamente.

Dosis: 1 ml de la solución reconstituida por cada 50 kg de peso corporal durante 10 días.

PRESENTACIÓN:

Caja con 10 frascos de liofilizado de 50mg de Ácido Tiludrónico y 10 diluyentes estériles de 10 mL.

COMPOSICIÓN:

Ácido Tiludrónico 50 mg Vehículo c.b.p 1 vial

PERÍODO DE RESGUARDO:

0 (cero) días

REGISTRO SAG:

N° 2037

PARA USO EN:

Intra Repiderma

SPRAY DE PROTECCIÓN DE LA PIEL PARA ANIMALES DE GRANJA

Aumenta el cuidado de la piel y cascos de los animales. El Zinc micronizado y el quelato de cobre son fácilmente absorbidos por la piel, de esta manera actúa efectiva y rápidamente.

Recomendado para; cuidado de pezuñas y línea blanca, cuidado de ombligo en neonatos, cuidado de la ubre, posterior al descornado dando protección de insectos e infecciones parasitarias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Producto sólo para su uso externo. Agitar bien antes de usar. Aplicar el spray en la superficie de la piel por 3 segundos desde una distancia de 15 a 20 cm, de esta manera la piel estará uniformemente coloreada. Si es necesario, repetir después de 30 segundos. Permitir actuar el producto al menos 30 segundos.

PRECAUCIONES:

Asegurarse que el spray no entre en contacto con los ojos ya que puede causar irritación.

Limpiar la superficie de la piel completamente antes de aplicar Intra Repiderma.

Asegurarse que la superficie de la piel permanece seca después de la aplicación.

PRESENTACIÓN:

Splay de 250ml.

COMPOSICIÓN:

- Quelato de cobre
- Quelato de Zinc
- Mezcla de Butano/propano.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a temperaturas bajo los 25 °C.
- No refrigerar ni congelar.
- Proteger de la humedad y de la luz del sol.

PARA USO EN:



Mistral

POLVO SECANTE O DESECANTE REVERSIBLE

En sala de partos y ternereras disminuye la humedad, la putrefacción, el mal olor y la multiplicación de microorganismos patógenos. Se esparce como una capa bajo la paja o viruta. El ambiente seco desincentiva la postura de huevos por parte de las moscas.

Posee aceites esenciales repelentes de insectos. Utilizado en camas de patios de alimentación disminuye la mastitis y el recuento de células somáticas.

Se usa en la zona posterior (área de reposo de la ubre). Se usa para secar y proteger el ombligo de infecciones luego del nacimiento. Usado como Pediluvio seco mejora la resistencia de pezuñas y tejidos podales blandos, además de controlar microorganismos patógenos gracias a su actividad bacteriostática.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Terneras: 100 a 150 gr por metro cuadrado 2 veces a la semana, dependiendo de carga animal

Cama para vacas: 100 a 150 gr por sector donde apoya la ubre por dos veces a la semana

Pediluvio seco: aplicar una bolsa en un contenedor pediluvio seco una vez a la semana procurando tapar hasta la zona de la corona

PRESENTACIÓN:

Saco de 25 kg

PARA USO EN:

COMPOSICIÓN:

Mistral combina en fórmula innovadora, ingredientes activos naturales (producto original con arcillas de partículas esféricas, algas y aceites esenciales). Tiene la capacidad de absorber líquidos de forma reversible, es decir, es reutilizable luego de liberarse de la humedad. Puede absorber urea antes de que se transforme en amoníaco limitando su liberación al medio y dismuyendo los problemas respiratorios.

Secure Horse Flash

ANÁLOGO SINTÉTICO DE APACIGÜINA EQUINA

SecureHorseFlash® está diseñado para caballos jóvenes y adultos cuando experimentan nuevas situaciones o actividades. SecureHorseFlash® también se puede usar en caballos nerviosos o muy sensibles y durante las siguientes situaciones:

- Desplazamiento: estacionamiento, recuperación después del aterrizaje (camión, avión, tren).
- Cambios ambientales: mudanza, desmontaje, cambio de establo, nuevo propietario.
- Situaciones de trabajo: adaptación, aprendizaje y formación en situaciones nuevas o potencialmente temerosas/estresantes.
- Situaciones sociales: separación del potro de la madre, soledad, recién llegado.
- Cuidados: visita al veterinario, herrador, recorte.
- Ruido y luces: tormentas eléctricas, disparos, fuegos artificiales, multitudes, vehículos, luces intermitentes.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Aplicar gel cuando el caballo este en un entorno y en estado tranquilo.

Aplicar SecureHorseFlash® 30 minutos antes del evento estresante.

Cada stick es una aplicación.

Abra la barra y empuje el gel sobre sus dedos y aplique el gel en la base de las fosas nasales.

Repetir si es necesario cada 2 o 2,5 horas.

PRESENTACIÓN:

Caja con 10 stick.

PARA USO EN:

COMPOSICIÓN:

Análogo feromona odorífera maternal (BAP) 1% Excipientes 1 litro.

PERÍODO DE RESGUARDO:

Almacenar en lugar fresco y seco a una temperatura entre 10° C y 30° C.

Seguridad:
Mantener fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, consulte un médico y muéstrele las instrucciones.



Oxilen® LA

OXITETRACICLINA DIHIDRATO 21,56%

Tratamiento de cuadros infecciosos causados por bacterias sensibles al principio activo, tales como: Escherichia Coli, Pasteurella multocida, Leptospira interrogans, Haemophilus somnus, Klebsiella, Pneumoniae, Actinobacillus lignieresi, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis y Streptococcus zooepridermicus.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Equinos: 1 ml/ 10 kg peso vivo, equivalente a 20 mg/kg peso vivo de Oxitetraciclina.

Vía de Administración:

Inyección intramuscular profunda, dosis única.

Aves: subcutanea.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas No administrar a animales en periodo de gestación.

No administrar vía endovenosa.

PRESENTACIÓN:

Frasco multidosis de 100 ml y 250 ml

PARA USO EN:

COMPOSICIÓN:

Análogo Secreción odorífera maternal (BAP) 1% Excipientes 1 litro.

PERÍODO DE RESGUARDO:

Carne: 28 dias.

Precauciones especiales de conservación:
Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C y protegido de la luz.

REGISTRO SAG:

Nº 325-B

Condroitin 10 IM

REGENERADOR OSTEOARTICULAR, CONDROPROTECTOR, ANTIINFLAMATORIO Y ANALGÉSICO

Coadyuvante en el tratamiento y profilaxis de patologías osteoarticulares - Artrosis - Osteoartritis - Espondiloartrosis - Condroprotector en el uso prolongado de corticoides sistémicos - Entrenamiento intensivo del equino deportivo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía Intramuscular

Se recomienda una aplicación, por vía intramuscular cada 4 días durante 28 días.

Inyectar Condroitin 10% sin mezclar con otras drogas.

En caballos adultos: administrar 5 ml de producto.

En potrillos: administrar 2,5 ml de producto.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 4 frascos ampollas de 5 ml cada uno.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta de Médico Veterinario

PARA USO EN:

COMPOSICIÓN:

Cada frasco ampolla contiene:

- Condroitin sulfato "A" 0,5 g
- Excipientes c.s.p 5.0 mL

PERÍODO DE RESGUARDO:

No utilizar en caballos con destino a consumo humano

Advertencias:
Mantener las condiciones de asepsia que caracterizan la administración de medicamentos.

REGISTRO SAG:

Nº 1279



Flunix Deltavet

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE, ANALGÉSICO, ANTITÓXICO, ANTIPIRÉTICO AL 8,32%

Tratamiento de inflamaciones musculoesqueléticas o artríticas. Cólico en la especie equina, controla rápida y eficazmente el dolor y la inflamación. Flunix comienza a actuar dentro de las 2 horas de su aplicación. El pico de acción ocurre entre las 12-16 horas y la duración de la actividad es de 24-36 horas. En cólicos comienza a actuar aliviando el dolor generalmente dentro de los 15 minutos de su aplicación. En alteraciones del aparato locomotor, mantiene actividad terapéutica hasta 36 horas. Antinflamatorio no esteroide 4 veces más potente que la fenilbutazona.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intramuscular o endovenosa. Se recomienda la vía endovenosa para el rápido alivio del dolor.

1 ml cada 45 kg intramuscular o endovenosa.

ADVERTENCIAS

- No administrar a potrillos de menos de 72 horas de vida.
- No administrar a hembras gestantes.
- No administrar a caballos de carrera dentro de los 8 días previos a la prueba.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 50 ml.

PARA USO EN:

COMPOSICIÓN:

Cada frasco ampolla contiene:

- Flunixino Meglumina 8.32 g
- Excipientes c.s.p 100 mL

PERÍODO DE RESGUARDO:

No utilizar en caballos con destino a consumo humano

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta de Médico Veterinario

REGISTRO SAG:

Nº 1807

Zeropar

ANTIPARASITARIO EN PASTA ORAL DE AMPLIO ESPECTRO PARA CABALLOS. IVERMECTINA 1,2%, PRAZICUANTEL 15%

Es un antiparasitario de amplio espectro para caballos. Esta indicado en el tratamiento de parasitosis causados por: grandes estrígilos: Strongylus vulgaris (adulto y larva arterial), Strongylus edentatus (adulto y larva enquistada) Strongylus equinus (adulto), Triodotophorus spp (adulto). Cestodos: Anoplocephala magna y perfoliata; Paranoplocephala mamilana (adulto y formas inmaduras, escólex y cuerpo). Larvas: Gasterophilus spp (estadios orales y gástricos); esta indicado en el control de lesiones cutáneas cusadas por larvas Habronema spp. Otros nematodos como Parascaris equorum (adultos y larcas del tercer y cuarto estadio), Oxyurus equi (adulto y larcas de tercer y cuarto estadio); Trichostrongylus axei (formas inmaduras, escólex y cuerpo)

ADMINISTRACIÓN :

Vía Oral.

Coloque el extremo de la jeringa en el espacio interdental verificando que contenga alimento.
El embolo de la jeringa debe ser ajustado para que la dosis del medicamente pueda ser depositada en la lengua del animal, en la porción posterior e inmediatamente eleve la cabeza por algunos segundos para garantizar que la dosis indicada sea deglutida. Cada jeringa de 10 gramos alcanza para tratar animales de hasta 600 kilos y cada jeringa de 30 gramos (multidosis) alcanza para tratar 1800 kilos.
La administración de este producto es segura en todos los estados fisiológicos.

DOSIS:

La dosis recomendada es 1 gramo por cada 60 kilos de peso vivo, equivalente a 0,20 ml de ivermectina por kilo y 2,5 mg de praziquantel por kilo de peso.

Administrar cada 3 o 4 meses, según la carga parasitaria.

COMPOSICIÓN:

- Ivermectina 1,2 g
- Prazicuantel 15 g
- Excipientes 100 gr

PARA USO EN:



Zeropar

ANTIPARASITARIO EN PASTA ORAL DE AMPLIO ESPECTRO PARA CABALLOS. IVERMECTINA 1,2%, PRAZICUANTEL 15%

Es un antiparasitario de amplio espectro para caballos. Esta indicado en el tratamiento de parasitosis causados por: grandes estrígilos: Strongylus vulgaris (adulto y larva arterial), Strongylus edentatus (adulto y larva enquistada) Strongylus equinus (adulto), Triodotophorus spp (adulto). Cestodos: Anoplocephala magna y perfoliata; Paranoplocephala mamilana (adulto y formas inmaduras, escólex y cuerpo). Larvas: Gasterophilus spp (estadios orales y gástricos); esta indicado en el control de lesiones cutáneas cusadas por larvas Habronema spp. Otros nematodos como Parascaris equorum (adultos y larcas del tercer y cuarto estadio), Oxyurus equi (adulto y larcas de tercer y cuarto estadio); Trichostrongylus axei (formas inmaduras, escólex y cuerpo)

ADVERTENCIAS:
No administrar a potrillo de menos de 6 de semanas de edad.

EFECTOS SECUNDARIOS:
No se han descrito

PERIODO DE RESGUARDO:
No utilizar en caballos con destino a consumo humano

PARA USO EN:

PRESENTACIÓN:
Jeringa dosificadora de 10 gramos (para 600 kilos) y jeringa multidosis de 30 gramos (para 1800 kilos)

CONDICIÓN DE VENTA:
Venta bajo receta de Médico Veterinario

REGISTRO SAG:
N° 1649-B

VADEMECUM 2023

EQUINOS