



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Vacuna inactivada polivalente para infecciones causadas por Clostridios en bovinos y ovinos

Reg. SAG. Nº:
1667-B



Fórmula

COGLAVAX®

Cada dosis contiene:

- Antitoxina alfa de *Clostridium perfringens* Tipo A
- Antitoxina beta de *Clostridium perfringens* Tipo C
- Antitoxina epsilon de *Clostridium perfringens* Tipo D
- Antitoxina de *Clostridium novyi* Tipo B
- Antitoxina de *Clostridium septicum*
- Antitoxina de *Clostridium tetani*
- Anacultivo de *Clostridium chauvoei*

Hidróxido de aluminio
Excipientes csp



Indicaciones

COGLAVAX®

Bacterina y toxoide utilizada para la inmunización activa contra toxemias debidas a *Clostridium perfringens* tipo A, C y D, *Clostridium septicum*, *Clostridium tetani*, *Clostridium novyi* B y *Clostridium chauvoei*, y para otorgar inmunización pasiva a las crías, en bovinos y ovinos. Previene la enterotoxemia, disentería bacilar en corderos y bovinos, riñón pulposo, enteritis hemorrágicas en corderos, hepatitis necrótica, edema maligno de abomaso, mancha negra, gangrena gaseosa, tétanos y carbunco sintomático.



Administración y dosis

Vacuna polivalente de aplicación subcutánea.

Aplicar 2 mL en ovinos con intervalo de 4 semanas para primovacunación, y revacunación anual o 2-4 semanas antes del período de riesgo.

En bovinos de menos de 100 kg, vacunar con dos dosis de 2 mL con intervalo de 6 semanas en primovacunación, y revacunación anual con 4 mL. En bovinos adultos, aplicar 4 mL con intervalo de 6 semanas, y revacunación anual. Se puede aplicar a hembras gestantes.



Advertencias y Almacenamiento

Se puede producir una pequeña reacción en el punto de inyección, formándose un nódulo que desaparece en algunas semanas. Igual que para todas las vacunaciones, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad en los animales ya sensibilizados por la inyección.

Una vez abierto debe ser usado rápidamente. Vacunar solamente los animales en buen estado de salud. Agitar antes de usar. Respetar las reglas de asepsia. En caso de inyectarse el operador, consultar inmediatamente al médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Período de resguardo: 0 días.

Conservación: Entre +2° C y +8° C. No congelar.



Presentación:

Frascos de 100 y 250 ml

COGLAVAX® es una marca registrada y/o autorizada por Ceva Sante Animale.

Ceva Salud Animal S.R.L.

Camila O'Gorman 412, 12º Piso (C1107DED) Buenos Aires - Argentina

Tel. +54 11 3724 7700

www.ceva.com.ar



@CevaArgentina



Ceva Salud Animal Argentina



ceva_argentina



Juntos, más allá de la Salud Animal