

Ilium Trimedexil

SOLUCION INYECTABLE

Aniinflamatorio - Esteroidal

Composición cada 1 ml:

Dexametasona trimetilacetato.....5mg
Excipientes c.s.p.....1ml

Especies: Caballos, Bovinos, Cerdos y Perros

Indicaciones:

Indicado en el tratamiento de enfermedades cuando se desea un efecto antiinflamatorio, antialérgico y antitóxico. Las condiciones músculo-esqueléticas, que incluyen sinovitis agudas y crónicas, tendinitis, bursitis, miositis y periostitis.

En caballos se utiliza en inflamación de las articulaciones, vaina de los tendones y mioglobulinuria sinovial, laminitis y enfermedades alérgicas de la piel.

En vacunos en casos de cetosis, paresia parturienta, paraplejia, tetania de los forrajes, laminitis, intoxicación debido a la mastitis y metritis (con cubierta antibiótico), bursitis y sinovitis, además de inducción al parto.

En los cerdos en el Complejo mastitis-metritis-agalactia (MMA), laminitis y enfermedades dermatológicas alérgicas.

Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:

Caballos, vacunos y cerdos: 0,5 a 1 ml / 100 kg de peso (máximo 5 ml).

Potrillos, terneros y perros: 0,5 ml / 50 kg de peso.

Vía de administración:

Intramuscular, Intrasinovial, Intraarticular o subcutánea.

Precauciones:

No administrar a hembras en periodo de gestación o lactancia. No administrar a animales sensibles a la Dexametasona

Almacenamiento

Temperatura ambiente entre 15 y 30° C. protegido de la luz solar

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante

Reacciones Adversas:

No se han descrito

Período de Resguardo:



Carne 36 días

Leche: 6 días

No Administrar a caballos destinados al consumo humano

Presentación: Frasco de 50 ml

Condición de Venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Reg.S.A.G. N° 778