

VETEGLAN

Solución inyectable

Análogo sintético de prostaglandina F2 α

Composición:

Cada 1 ml contiene:

d- Cloprostenol.....0.075 mg/ml

Excipientes c.s.p. 1ml



Especies: Cerdos y Vacas

Indicaciones:

Vacas: Celos silentes. Inducción del celo. Sincronización del estro. Quistes luteínicos o cuerpos lúteos persistentes.

Cerdas: Inducción del parto.

Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:

Vacas: 2 ml de Veteglan/animal (equivalente a 150 μ g/animal). Intramuscular

Inducción del estro: Administrar Veteglan después de haber establecido la existencia de un cuerpo lúteo funcional (dosificación de progesterona), generalmente en los días 6 al 18 del ciclo. La ovulación aparece entre las 48 - 60 horas posteriores al tratamiento. Si no aparece ninguna manifestación del estro, puede repetirse la dosis a los 11 días de la primera.

Inducción al parto: Administrar Veteglan transcurridos 270 días de gestación, el parto deberá iniciarse a las 30 - 60 horas después del tratamiento.

Sincronización del estro: La sincronización tiene lugar efectuando 2 inyecciones separadas entre sí 11 días.

Quistes luteínicos o cuerpo lúteo persistente: Administrar Veteglan y esperar a la aparición del siguiente estro.

Cerdas: 1 ml de Veteglan/animal (Equivalente a 75 μ g/animal). Intramuscular

Inducción al parto: Administrar Veteglan a los 112 días de gestación el 70% de los animales inician el parto en las 20 horas siguientes.

Contraindicaciones:

No administrar a hembras en gestación, a menos que se desee la inducción del parto o del aborto.

No administrar en animales con disfunciones espásticas del tracto gastrointestinal y o del sistema respiratorio.

Período de Resguardo:

Vacas 0 días
Cerdas 1 días

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en un lugar fresco y seco entre 15 y 30° C.

Presentación: Frascos de 20 ml

Condición de Venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Reg.S.A.G. 2226