

Ivervet 1%

Ivermectina 1%

Composición cada ml:

Cada 100 ml de producto contiene:

Ivermectina 3.15 g

Excipientes c.s.p. 100 ml

Especies: Bovinos, cerdo

Indicaciones:

Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares, ácaros productores de la sarna, piojos chupadores y estados larvarios de dípteros causantes de miasis en bovinos y cerdos. Ayuda en el control de piojos masticadores.

IVERVET solución inyectable es usada para el tratamiento y el control de:

Parásitos gastrointestinales (adultos y larvas):

Bovinos: *Ostertagia ostertagi*, *Haemonchus* sp, *Bunostomum* sp, *Oesophagostomum radiatum* (adultos), *Nematodirus helvetianus* (adultos), *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Strongyloides ransomi*, *Cooperia* spp (leve efectividad).

Cerdos: *Ascaris suum* (adultos y larvas), *Hyoststrongylus rubidus* (adultos y larvas), *Strongyloides ransomi*.

Parásitos pulmonares: (adultos y larvas)

Bovinos: *Dictyocaulus viviparus*

Cerdos: *Metastrongylus* spp (adultos)

Piojos:

Bovinos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*.

Cerdos: *Haematopinus suis*.

Ácaros:

Bovinos: *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Psoroptes bovis*.

Cerdos: *Sarcoptes scabiei* var. *Suis*



**Dosis y vía de administración:**

Administrar por vía subcutánea, en dosis única.

Bovinos: 200 µg / k.g.p.v. (1 mL de producto por cada 50 kilos). Cerdos: 300 µg / k.g.p.v. (1 mL por cada 33 kilos).

Contraindicaciones**Periodo de resguardo**

Entre la aplicación del producto y el sacrificio del animal para consumo humano deben transcurrir 49 días.

No administrar a vacas en producción de leche destinada a consumo

Precauciones especiales de conservación:

Almacenar a temperatura ambiente entre 10 y 30°C y protegido de la luz

Condición de Venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Presentación

Frasco multidosis de 50 ml y 500 ml

Resolución SAG:

N 326-B