

Flunix Deltavet

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE, ANALGÉSICO, ANTITÓXICO, ANTIPIRÉTICO Al 8,32%

Composición: cada frasco ampolla contiene:

Flunixin Meglumina	8.32 g
Excipientes c.s.p	100 mL

Especies: Equinos

Indicaciones:

Tratamiento de inflamaciones musculoesqueléticas o artríticas. Cólico en la especie equina
Controla rápida y eficazmente el dolor y la inflamación.

Flunix comienza a actuar dentro de las 2 horas de su aplicación. El pico de acción ocurre entre las 12-16 horas y la duración de la actividad es de 24-36 horas. En cólicos comienza a actuar aliviando el dolor generalmente dentro de los 15 minutos de su aplicación. En alteraciones del aparato locomotor, mantiene actividad terapéutica hasta 36 horas. Antiinflamatorio no esteroide 4 veces más potente que la fenilbutazona.

Dosis:

1 ml cada 45 kg intramuscular o endovenosa. Se recomienda la vía endovenosa para el rápido alivio del dolor.

Vía de Administración y modo de empleo:

Intramuscular o endovenosa. Se recomienda la vía endovenosa para el rápido alivio del dolor.

Advertencias

No administrar a potrillos de menos de 72 horas de vida

No administrar a hembras gestantes

No administrar a caballos de carrera dentro de los 8 días previos a la prueba

Efectos secundarios

No se han descrito

Periodo de resguardo

No utilizar en caballos con destino a consumo humano

Presentación

Frasco de 50 ml

Condición de venta

Venta bajo receta de Médico Veterinario

Registro SAG: 1807

