

Mastitis Secado

Terapia de secado

Composición:

Cada jeringa de 4,5 g , contiene:

Cloxacilina benzatina.....638mg

Ampicilina trihidrato.....289mg

Excipientes c.s.p 4,5 g

Especies: Bovinos

Indicaciones:

Indicado para utilización en vacas lecheras (incluidas vaquillas) en el momento del secado, esto es inmediatamente después de la última ordeña de lactación para tratar mastitis subclínica causada por microorganismos Gram-Positivos y Gram-Negativos como *Streptococcus agalactia* y otras especies estreptococáceas, penicilinas resistentes y estafilococos sensibles, *Corynebacterium spp.* y *Escherichia Coli*, además de proporcionar protección contra más infecciones durante el periodo de secado.

Dosis: Dosis única, una jeringa por cada cuarto

Vía de Administración: Administración intramamaria

Contraindicaciones

No usar en vacas en lactancia. No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a los componentes de este producto.

Periodo de resguardo

Administrar hasta 30 días antes del parto y la leche producida solo podrá destinarse a consumo humano o industrial después de 4 días posterior al parto. Carne: 28 días después del tratamiento

Precauciones especiales de conservación:

Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C y protegido de la luz

Presentación

Caja con 4 jeringas. Incluye toallitas húmedas antisépticas.

Condición de Venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Resolución SAG:N 1017-B.