

Salfen®

Antibiótico

Solución inyectable

Composición:

Cada mL de producto contiene:

Sulfadiazina200mg

Trimetoprima.....40mg

Excipientes c.s.p 1 mL



Especie de destino

Bovino, Caprino, Caballo, Ovino, Cerdo, Perros y Gatos.

Indicaciones:

Infecciones del sistema respiratorio (neumonías y pleuroneumonías), infecciones entéricas, articulares y genitourinarias producidas por bacterias sensibles a los principios activos.

Dosis, vía de administración y modo de empleo:

Caballos, Bovinos, Ovinos, Caprinos y Cerdos	I.M.: 1 mL cada 15 kg de peso (equivalente a 13,3 mg de Sulfadiazina/kg de peso y 2,6 mg de Trimetoprima/kg de peso), cada 12 horas por 5 días. En bovinos, no administrar más de 20 mL por sitio de inyección. En cerdos, no más de 10 mL. En caprinos, ovinos y caballos, no más de 5 mL por sitio de inyección.
	I.V.: 1 mL cada 10 kg de peso, equivalente a 20 mg de Sulfadiazina/ kg de peso y 4 mg de Trimetoprima/kg de peso, cada 12 horas por 5 días. En caballos vía intravenosa lenta.
Perros y Gatos	S.C.: 1 mL cada 8 kg de peso, equivalente a 25 mg de Sulfadiazina/kg de peso y 5 mg de Trimetoprima/kg de peso, cada 24 horas por 5 días.

Contraindicaciones

No administrar a hembras gestantes o deshidratadas que deben ser corregidos en su desbalance hidrosalino. No usar en animales hipersensibles a las Sulfas o Trimetoprima.

Efectos secundarios

La administración intramuscular puede producir efectos irritantes que desaparecen entre 24 a 72 horas. En perros se ha descrito, en baja proporción, la aparición de queratoconjuntivitis sicca en la terapia con asociaciones homologas: cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima), pero no se pueden descartar que la asociación presente puede inducir el cuadro.

Periodo de resguardo

Carne: 30 días.

Leche: 4 días.

No administrar a caballos cuya carne se destine a consumo humano.

Precauciones especiales de conservación:

Mantener a temperatura ambiente, menos de 25°, protegido de la luz. No refrigerar ni congelar.

Una vez abierto, utilizar dentro de 12 semanas.

Presentación

Frasco multidosis de 100 mL

Condición de Venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Resolución SAG:N 1031