FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO VIOBIX® F3+R

NOMBRE COMERCIAL	**VIOBIX® F3+R**
PRESENTACIÓN	Estuche con 2, 10 o 20 frascos conteniendo 1 mL. Incluye inserto.
FABRICANTE	BIOVETA a. s., Komenskeho 212/12, 683 23 lvanovice na Hane, República Checa
MATERIAL DE ENVASE	**Primario:** frasco de vidrio tipo I, etiquetado, cerrado con tapón de goma y sello de aluminio. **Secundario:** estuche PET etiquetado.
FORMA FARMACÉUTICA	Emulsión Inyectable.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO	**Dosis:** 1 mL. **Vía de administración:** Subcutánea. **Especie de destino:** Gatos. **Esquema de vacunación:** **Primera dosis:** Con vacuna VIOBIX® F3, Registro SAG N°2653-B, a partir de los 3 meses de edad. **Segunda dosis:** 3-4 semanas posteriores. **Revacunación anual:** 1 dosis.
INDICACIONES DE USO	Inmunización activa, para la prevención de infecciones producidas por Parvovirus Felino, Calicivirus Felino, Herpesvirus Felino y virus de la Rabia. **Establecimiento de la inmunidad:** 3 semanas para Parvovirus Felino y 4 semanas para Calicivirus Felino, Herpesvirus Felino y virus de la Rabia. **Duración de la inmunidad:** 12 meses.
COMPOSICIÓN	Cada dosis contiene: Parvovirus Felino, Cepa Bio 7 PR≥1 Calicivirus felino, Cepa Bio 8 PR≥1 Herpesvirus felino, Cepa Bio 9 PR≥1 Virus Rábico, Cepa Bio 16 ≥ 1UI Excipientes c.s.p. 1 mL Preservante: Timerosal Adyuvante Oleoso
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ADVERSAS	**Contraindicaciones:** No vacunar animales que muestren signos de rabia o que se sospeche que puedan estar infectados con el virus Rábico. **Efectos adversos o reacciones adversas:** Se pueden presentar muy raramente reacciones de hipersensibilidad en el lugar de inoculación correspondiente a una hinchazón transitoria (normalmente de hasta 0,5 cm de diámetro) y un dolor que desaparece en 3 semanas. **Advertencias y precauciones especiales de uso:** Se recomienda desparasitar al menos 10 días antes de la vacuna. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

	Precauciones para el manipulador: En caso de inyección accidental, busque atención médica inmediatamente y muestre el inserto del producto. **Interacción con otros productos farmacéuticos:** No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización. **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho, incluyendo su envase primario y contenido:** Se recomienda utilizar todo el contenido del envase una vez abierto. No conservar frascos con remanente de producto no utilizado. Para eliminar los envases y desechos se recomienda la incineración. USO VETERINARIO. VENTA SOLO MÉDICOS VETERINARIOS. PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA.
PERIODO DE RESGUARDO	N/A
REGISTRO SANITARIO	**CHILE:** Reg. SAG N° 2654-B
ESTABILIDAD O PERÍODO DE EFICACIA	24 meses
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener refrigerado: entre 2 - 8 ºC. No congelar. Utilizar inmediatamente una vez abierto.