# FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO VIOBIX® C PUPPY ADVANCED

| | |
|---|---|
| **NOMBRE COMERCIAL** | **VIOBIX® C Puppy Advanced** |
| **PRESENTACIÓN** | Estuche con 10, 25 o 50 frascos de fracción liofilizada + 10, 25 o 50 frascos de diluyente. Incluye inserto. |
| **FABRICANTE** | BIOVETA a. s., Komenskeho 212/12, 683 23 lvanovice na Hane, República Checa |
| **MATERIAL DE ENVASE** | **Primario:**<br>**Fracción liofilizada:** frasco de vidrio tipo I, etiquetado, cerrado con tapón de goma de bromobutilo y tapa de aluminio con flip-off.<br>**Diluyente:** frasco de vidrio tipo I, etiquetado, cerrado con tapón de goma de clorobutilo y tapa de aluminio con flip-off.<br>**Secundario:** estuche PET etiquetado |
| **FORMA FARMACÉUTICA** | Polvo liofilizado para Suspensión Inyectable. |
| **DOSIS Y MODO DE EMPLEO** | **Dosis:** 1 mL.<br>**Vía de administración:** Subcutánea.<br>**Especie de destino:** Perros, cachorros.<br><br>Reconstituir la fracción liofilizada con el diluyente, de forma aséptica. Agitar antes de usar. Administrar asépticamente.<br><br>**Primovacunación:** A partir de las 6 semanas de edad. 3 semanas después se debe iniciar la vacunación polivalente.<br><br>**Revacunación anual:** No aplica.<br><br>**Edad o peso:** A partir de la 6 semana de edad.<br><br>**Condición fisiológica:** Animales sanos, con buena condición nutricional. |
| **INDICACIONES DE USO** | Inmunización activa, para prevenir la mortalidad y signos clínicos causados por Distemper canino y Parvovirus canino.<br><br>Inmunización activa, para prevenir los signos clínicos, leucopenia y excreción viral causados por Parvovirus canino.<br><br>**Inmunidad protectiva:** 14 días después de la primera dosis.<br>**Duración de la inmunidad:** 12 meses. |
| **COMPOSICIÓN** | Cada dosis reconstituida contiene:<br><br>Virus de Distemper canino, cepa CDV Bio 11/A $10^{4.1}$ a $10^{5.5}$ $TCID_{50}$<br><br>Parvovirus canino Tipo 2b, cepa CPV-2b Bio 12/B $10^{5.5}$ a $10^{7.0}$ $TCID_{50}$<br><br>Excipientes c.s.p. 1 mL |
| **PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ADVERSAS** | **Contraindicaciones:** No vacunar hembras gestantes ni durante la lactancia.<br><br>**Efectos adversos o reacciones adversas:** Se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad en el lugar de inoculación, correspondiente a una hinchazón transitoria |

| | |
|---|---|
| | (hasta 5 cm) que ocasionalmente puede ser dolorosa, caliente o enrojecida. Estas reacciones remiten espontáneamente o disminuyen significativamente al cabo de 14 días después de la vacunación.<br><br>**Advertencias y precauciones especiales de uso:** MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.<br><br>**Interacción con otros productos:** No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.<br><br>**Precauciones especiales para el manipulador:** En caso de inyección accidental, busque atención médica inmediatamente y muestre el inserto del producto.<br><br>**Principales incompatibilidades:** No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, excepto con el diluyente que forma parte de este producto.<br><br>**Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar:** Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.<br><br>USO VETERINARIO. Venta bajo receta Médica Veterinaria. PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA. |
| **PERIODO DE RESGUARDO** | N/A |
| **REGISTRO SANITARIO** | **CHILE:** Reg. SAG N° 2627-B |
| **ESTABILIDAD O PERÍODO DE EFICACIA** | **Vacuna liofilizada:** 24 meses.<br>**Diluyente:** 60 meses.<br>**Presentación lista para la venta:** 24 meses |
| **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO** | Mantener refrigerado: entre 2 - 8 ºC. No congelar. Utilizar inmediatamente después de su reconstitución. |