FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO VIOBIX® RABIA

NOMBRE COMERCIAL	**VIOBIX® RABIA**
PRESENTACIÓN	Estuche con 10, 20, 50 o 100 frascos conteniendo 1 mL. Incluye inserto
FABRICANTE	BIOVETA a. s., Komenskeho 212/12, 683 23 lvanovice na Hane, República Checa.
MATERIAL DE ENVASE	**Primario:** frasco de vidrio tipo I, etiquetado, cerrado con tapón de goma de bromobutilo y sellado con tapa de aluminio con o sin flip-off. **Secundario:** estuche PET etiquetado.
FORMA FARMACÉUTICA	Suspensión Inyectable.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO	**Dosis:** 1 mL. **Vía de administración:** Subcutánea, preferiblemente en la región detrás del omóplato. Intramuscular, preferiblemente en el músculo de la extremidad trasera. **Especie de destino:** Perros y gatos. Los animales vacunados antes de los 3 meses de edad, deben ser revacunados al alcanzar la edad (con un intervalo mínimo de 14 días entre vacunaciones). Agitar antes de usar. Administrar asépticamente. **Primovacunación:** 1 dosis **Primera revacunación:** 1 año después de la primovacunación. **Revacunación posterior:** Cada 2 años. **Edad o peso:** A partir de las 12 semanas de edad. **Condición fisiológica:** Animales sanos, con buena condición nutricional.
INDICACIONES DE USO	Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la rabia. **Inicio de la inmunidad:** 14 – 21 días después de la vacunación. **Duración de la inmunidad después de la primovacunación:** 1 año. **Duración de la inmunidad después de la revacunación:** 2 años.
COMPOSICIÓN	Cada dosis contiene: Virus rábico, cepa SAD Vnukovo-32 Bio 16 ≥2.0 UI Excipientes c.s.p. 1 mL Adyuvante: Hidróxido de aluminio Preservante: Timerosal
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ADVERSAS	**Contraindicaciones:** No vacunar animales que muestren signos de rabia o que se sospeche que puedan estar infectados con el virus rábico. **Efectos adversos o reacciones adversas:** Ocasionalmente, se puede presentar una reacción local en el punto de inyección (normalmente del tamaño de un guisante) la cual desaparece en 3 semanas. Raramente se

	puede presentar una reacción anafiláctica, en cuyo caso se debe administrar tratamiento de soporte adecuado. **Advertencias y precauciones especiales de uso:** MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. **Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:** No vacunar hembras durante las 2 semanas previas al parto ni durante la lactancia. **Interacción con otros productos:** No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización. **Precauciones especiales para el manipulador:** En caso de inyección accidental, busque atención médica inmediatamente y muestre el inserto del producto. **Principales incompatibilidades:** No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico. **Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar:** Se recomienda utilizar todo el contenido del envase una vez abierto. No conservar frascos con remanente de producto no utilizado. Para eliminar los envases y desechos se recomienda la incineración. USO VETERINARIO. Venta solo médicos veterinarios. PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA.
PERIODO DE RESGUARDO	N/A
REGISTRO SANITARIO	**CHILE:** Reg. SAG N°2724-B
ESTABILIDAD O PERÍODO DE EFICACIA	24 meses
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener refrigerado: entre 2 - 8 ºC. No congelar.