DOPIRAL® ORAL

Meloxicam
Antinflamatorio/analgésico
Elaborado por Laboratorios Mistair



Presentación:
Frasco gotario

Composición:
Cada 1 mL contiene:

Meloxicam	1.5 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

Descripción:
Dopiral®Oral, Suspensión Oral está indicado en perros para el tratamiento del dolor y la inflamación asociada con osteoartritis.

Especie de destino:
Perro

Dosis y Administración
El Tratamiento inicial consiste en una dosis de 0,2 mg de Meloxicam/kg de peso vivo el primer día. Se continuará el tratamiento con una dosis de mantenimiento de 0,1 mg de Meloxicam/kg de peso vivo al día por vía oral (a intervalos de 24 horas

Vía de Administración
Oral

Modo de empleo
Tratamiento inicial consiste en una dosis de 0,2 mg de Meloxicam/kg de peso vivo el primer día. Se continuará el tratamiento con una dosis de mantenimiento de 0,1 mg de Meloxicam/kg de peso vivo al día por vía oral (a intervalos de 24 horas). Procedimiento de dosificación utilizando el dispensador gotario del frasco (razas pequeñas): El dispensador gotario del frasco, proporciona 0,05 mg de de Meloxicam por gota. - Dosis inicial: 4 gotas Dopiral®Oral/kg de peso vivo.

Dosis de Mantenimiento: 2 gotas Dopiral®Oral/kg de peso vivo.

Procedimiento de dosificación utilizando la jeringa dosificadora (razas medianas agrandes):
La jeringa posee una escala graduada en kg de peso vivo que corresponde a la dosis de mantenimiento 0,1 mg Meloxicam.

Dosis inicial: El inicio de la terapia requerirá el doble del volumen de mantenimiento, es decir llenar 2 veces la jeringa según el kg de peso vivo (Ej.: si el perro pesa 10 kg, llenar en 2 oportunidades la jeringa hasta la graduación 10 kg).

Dosis de Mantenimiento: llenar la jeringa hasta la graduación correspondiente al peso del perro por una sola vez

Condiciones de almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente entre 15° a 30° C en su envase original. Protegido de la luz.

REG SAG: 2241

BIOREP: