PROTOCOLO NEFROURINARIO

Manejo integrativo de trastornos renales y urinarios

OBJETIVO TERAPÉUTICO

Protocolo biorregulador diseñado para el manejo de pacientes con trastornos renales y del tracto urinario, tanto agudos como crónicos.
Combina medicina biorreguladora con acción antiinflamatoria, inmunomoduladora, reguladora del sistema urinario, favoreciendo la perfusión renal, el drenaje de toxinas y la protección del parénquima renal, promoviendo la recuperación funcional y la homeostasis.

INDICACIONES CLÍNICAS

- Enfermedad renal aguda (IRA)
- Enfermedad renal crónica (ERC)
- Cistitis idiopática felina
- Cistitis bacteriana
- Pielonefritis
- Urolitiasis (como coadyuvante)
- Proteinuria
- Insuficiencia renal postquirúrgica
- Pacientes geriátricos con deterioro renal
- Pacientes con nefropatías inflamatorias

PREPARACIÓN DE LOS FRASCOS

PREPARADO A
Modulación inflamatoria e inmunológica

Traumeel®
1 ampolla (5 ml)

+

Engystol®
1 ampolla (5 ml)

→



Completar con NaCl 0,9% o agua mineral sin gas hasta 30 ml.

Frasco gotario 30 ml.

Cada producto se presenta en una caja con 5 ampollas de 5 ml, permitiendo preparar hasta 5 frascos gotarios.

PREPARADO B
Regulación renal y soporte metabólico

Solidago compositum®
2 ampollas (2,2 ml c/u)

+

Ubichinon compositum®
2 ampollas (2,2 ml c/u)

+

Coenzyme compositum®
1 ampolla (5 ml)

→



Completar con NaCl 0,9% o agua mineral sin gas hasta 30 ml.

Frasco gotario 30 ml.

Cantidad de ampollas de cada producto, permite preparar hasta 5 frascos gotarios.

NUREXAN® ad us. vet.
(Comprimidos)

Administrar siguiendo la posología estandarizada para comprimidos

DOSIFICACIÓN Y FRECUENCIA ESTANDARIZADA

Presentación	Agudo (cada 8 horas)	Mantención (cada 24 horas)
Comprimidos	1 comprimido	1 comprimido
Frasco gotario	20 gotas	20 gotas

Frecuencia de ataque
1 comprimido o 1 ml (20 gotas) cada 15 minutos durante 2 horas.

DURACIÓN APROX. FRASCO 30 ml

	Agudo (cada 8 horas)	Mantención (cada 24 horas)
Preparado A	10 días	30 días
Preparado B	10 días	30 días

Duración calculada según la posología estandarizada.
La frecuencia de ataque puede reducir la duración del preparado.

IMPORTANTE

Este protocolo constituye una guía terapéutica orientativa. La combinación de medicamentos, la incorporación o exclusión de productos, las concentraciones y la frecuencia de administración pueden ser modificadas por el médico veterinario tratante de acuerdo con la evaluación clínica, la severidad del cuadro y el objetivo terapéutico de cada paciente.