PROTOCOLO VIRAL Y RICKETTSIAS

Manejo integrativo de enfermedades virales y rickettsiales

OBJETIVO TERAPÉUTICO

Protocolo biorregulador diseñado para el manejo de pacientes con enfermedades infecciosas de origen viral y rickettsial, tanto en fases agudas como durante la recuperación.
Combina medicina biorreguladora con acción inmunomoduladora, antiinflamatoria y de soporte metabólico celular, favoreciendo una respuesta inmune equilibrada, disminuyendo la inflamación y promoviendo una recuperación clínica integral.

INDICACIONES CLÍNICAS

- Distemper canino
- Parvovirosis canina
- Complejo respiratorio felino
- Herpesvirus felino
- Calicivirus felino
- Papilomatosis
- Ehrlichiosis
- Anaplasmosis
- Rickettsiosis
- Pacientes inmunosuprimidos
- Convalecencia postinfecciosa

PREPARADO ÚNICO

Modulación inflamatoria, inmunológica y soporte metabólico

Traumeel®
1 ampolla (5 ml)

+

Engystol®
1 ampolla (5 ml)

+

Coenzyme compositum®
1 ampolla (5 ml)



Completar con NaCl 0,9% o agua mineral sin gas hasta 30 ml.

Frasco gotario 30 ml.

Cada producto se presenta en una caja con 5 ampollas de 5 ml, permitiendo preparar hasta 5 frascos gotarios.

BENEFICIOS DEL PROTOCOLO

Modulación de la respuesta inmune
Favorece una respuesta inmune equilibrada y efectiva.

Disminución de la inflamación
Acción antiinflamatoria que ayuda a reducir los signos clínicos asociados a procesos infecciosos.

Soporte del metabolismo celular
Coenzyme compositum® apoya la función mitocondrial y la producción de energía celular.

Favorece la recuperación clínica
Promueve una convalecencia más rápida y completa, mejorando el bienestar del paciente.

DOSIFICACIÓN Y FRECUENCIA ESTANDARIZADA

Presentación	Agudo (cada 8 horas)	Mantención (cada 24 horas)
Comprimidos	1 comprimido	1 comprimido
Frasco gotario	20 gotas	20 gotas

Frecuencia de ataque

1 comprimido o 1 ml (20 gotas) cada 15 minutos durante 2 horas.

DURACIÓN APROX. FRASCO 30 ml

	Agudo (cada 8 horas)	Mantención (cada 24 horas)
Preparado Único	10 días	30 días

Duración calculada según la posología estandarizada.
La frecuencia de ataque puede reducir la duración del preparado.

IMPORTANTE

Este protocolo constituye una guía terapéutica orientativa. La combinación de medicamentos, la incorporación o exclusión de productos, las concentraciones y la frecuencia de administración pueden ser modificadas por el médico veterinario tratante de acuerdo con la evaluación clínica, la severidad del cuadro y el objetivo terapéutico de cada paciente.